



WWF



FAKTAARK

2017

Gorilla

Gorillaer er blandt de mest ikoniske dyr, ikke kun på grund af deres størrelse og styrke, men også på grund af deres kærlige og menneskelignende adfærd. Gorillaen har været en af WWF's fokusarter i mere end 40 år. Men alle fire underarter af gorilla er kritisk truede, og det er en svær og kompleks opgave at sikre gorillaernes overlevelse. Det kræver handling helt oppe fra regeringsniveau og til forbrugere rundt omkring i verden.

GORILLA

Gorilla gorilla (vestlig gorilla)

Gorilla beringei (østlig gorilla)

Status

Kritisk truet

2
5 1 ?

Vestlig : ca. 100.000 individer
Østlig : under 4.880 individer



Vestlig: Cameroun, Central
Afrikanske Republik, Ekvatorial
Guinea, Gabon, Angola, Nigeria
Østlig: DR Congo, Rwanda,
Uganda



Tropisk regnskov




Vestlig: ca. 155 cm høj
Østlig: op til 170 cm høj



Vestlig: op til 157 kg
Østlig: op til 205 kg



Op til 40 år



Den VESTLIGE
gorilla er mindre
end den ØSTLIGE og har
lysere og kortere
pels

Om gorilla

Der findes fire underarter af gorilla: Den vestlige lavlandsgorilla og cross river gorilla hører ind under arten vestlig gorilla, mens bjerggorilla og østlig lavlandsgorilla (grauer's gorilla) hører ind under arten østlig gorilla. Alle er kritisk truede.

Gorillaer er de største menneskeaber på jorden. De lever i familieflokke, typisk på 5-10 individer. Flokken bliver ledt af den dominerende han. Hannen bliver kønsmoden, når den er ca. 15 år og bliver herefter kaldt sølvryg. Hunnen får sin første unge, når den er ca. otte år og føder en unge hvert femte år. Gorillaer er generelt ikke territoriale, og flokkes levesteder på op til 40 km² kan sagtens overlappe.

Om natten sover gorillaer i reder. De yngre foretrækker at bygge dem oppe i træerne, mens de ældste sover på jorden. En voksen hangorilla kan spise op til 18 kg føde om dagen. Alle gorillaer lever af rødder, frugt, græs, frø, blade og kviste. De kan også finde på at spise termitter, larver, snegle og biller. Vestlig lavlandsgorilla lever mest af frugt, mens bjerggorillaen primært spiser blade. De behøver ikke aktivt at drikke vand, da de får væske nok gennem den vegetation, de spiser, og fra duggen på planterne om morgenen.



Kort over gorillaers udbredelse

■ Vestlig gorilla

■ Østlig Gorilla

Udbredelse og levesteder

Den vestlige lavlandsgorilla, der har en samlet bestand på måske 100.000 individer, lever i Congo-bassinet i de centralafrikanske regnskove. Den findes særligt i de lavtliggende skove i en højde fra havniveau og op til 1.600 meter over havets overflade.

Cross-river gorilla lever udelukkende i et lille område mellem Cameroun og Nigeria. Den findes i bambus- og regnskove i 1.500 til 3.000 meter over havets overflade. Man kender ikke meget til denne underart, og der findes kun få billeder af den. Man formoder, at der kun findes omkring 250-300 individer af Cross-river gorilla, og den er derfor verdens mest sjældne menneskeabe.

Den østlige lavlandsgorilla er den største af alle gorillaer. Den lever i de lavtliggende skove omkring Albertine Rift i DR Congo. Indtil midt 1990'erne formodede man, at der fandtes 17.000 individer. I dag er tallet under 4.000.

Bjerggorillaen findes i skove omkring 2.500 til 4.000 meter over havets overflade. Der findes to bestande, der samlet tæller 1.004 individer; Virunga-bestandene i DR Congo, Rwanda og Uganda, og Bwindi-bestanden i Uganda.

Antallet af østlig lavlandsgorilla er faldet fra 16.900 til 3.800 individer. På under én gorilla-generation.



© Martin Harvey / WWF

Vidste du?
At den berømte vestlige gorilla Koko kan mere end 1.000 ord på tegnsprog og forstå 2.000 engelske ord?

Trusler mod gorilla

Menneskelige aktiviteter i de centralafrikanske skove udgør de største trusler mod gorillaerne. Omfattende skovrydning for at skaffe tømmer, landbrug og veje stresser gorillaerne og reducerer deres levesteder. Det gør det også vanskeligere for dem at finde føde og skaber nemmere adgang for krybskytter.

Krybskytteri er især en trussel mod den østlige lavlandsgorilla. Gorillaens kød – også kaldet bushmeat – bliver handlet i stor stil på det sorte marked i Vest- og Centralafrika og anses som en stor delikatesse blandt mange byboere.

Gorillaernes lave fødselsrate betyder, at selv et lavt niveau af krybskytteri kan medvirke til et markant fald i bestandene.

Det er dog ikke kun efterspørgslen på bushmeat, der driver krybskytteriet. Gorillaer er også efterspurgt som kæledyr, og deres kropsdele bliver anvendt som trofæer og i traditionel medicin.

Sygdomme som ebola er kendt for at ramme menneskeaber særlig hårdt. I 2002 og 2003 udryddede ebola f.eks. 95 % af gorillaerne i Odzala National Park i Congo.

Kærlige forældre

Selvom op til 40 % af gorillaungerne dør som små, passer begge forældre enormt meget på deres unger. I de første måneder er ungen tæt knyttet til sin mor, både fysisk og psykisk. Først efter næsten et halvt år brydes den fysiske kontakt, men kun få sekunder af gangen. Og først når ungen er næsten to år gammel bevæger den sig længere væk fra moren. Faren, den dominerende sølvryg, spiller en vigtig rolle for den ældre unges socialisering og beskytter den mod andre aggressive hanner. Sølvryggen er også en stor støtte for ungen, når den skal fravendes mælk og begynde at spise fast føde.



© naturepl.com / Anup Shah / WWF

BLIV GORILLA- PARTNER

www.bidrag.wwf.dk



Det får du som Gorillapartner:

- Gorillanyhedsbrev 2x årligt
- WWF-magasinet Levende Natur 4x årligt
- Indbydelser til årlige foredrag om WWF's arbejde med truede dyr

Det gør WWF

I gennem mere end 40 år har WWF arbejdet for at beskytte bjerggorillaen. Vi har været med til at stifte International Gorilla Conservation Program (IGCP), som arbejder i felten med både Virunga- og Bwindi-bestandene. Gennem IGCP underviser vi om bæredygtig brug af skoven og om bevarelse af bjerggorillaerne. WWF Verdensnaturfonden arbejder desuden bl.a. med at reducere den ulovlige produktion af trækul, så gorillaernes levesteder bevares. Vi er med til at anlægge te-plantager som buffer-zoner mellem mennesker og gorillaer og vi giver tidligere krybskyttere bistader og vandtanke, så de ikke er afhængige af at skyde og sælge truede dyr.

Vores hårde arbejde for at bevare bjerggorillaerne virker! Siden 2010 er antallet af gorillaerne steget. I 2010 blev der talt 786 individer, i 2012 blev der talt 880 og den nyeste optælling fra 2018, finansieret af WWF Verdensnaturfonden blandt andre, har talt 1.004 bjerggorillaer.

WWF's arbejde med at beskytte vestlig lavlandsgorilla dækker et 36.000 km² stort område i Congo og Cameroun. Indsatsen inkluderer forbedringer af de eksisterende beskyttede områder, støtte af et gorilla overvågningsprogram, udvikling af ebola-vacciner og fremme af bæredygtig brug af skoven.

Arbejdet med cross-river gorillaen udmønter sig i et tæt samarbejde mellem WWF, Wildlife Conservation Society og regeringerne i Cameroun og Nigeria. Samarbejdet har bl.a. medført etableringen af et nyt naturreservat, og vi fokuserer nu på at etablere korridorer mellem eksisterende reservater.

For den østlige lavlandsgorilla arbejder WWF hovedsageligt på at bekæmpe krybskytteriet ved at donere nyt udstyr til patruljer og til at holde øje med tilstanden af familieflokke i Kahuzi-Biega National Park.

For mere information, kontakt:

Anton Thorsen
Senior Advisor on Forestry and M&E
a.thorsen@wwf.dk



WWF's mission:

At stoppe ødelæggelsen af jordens økosystemer og at bygge en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen.
www.wwf.dk